

Fourmidor®

**Insecticida autorizado para el control de hormigas.
Elimina adultos y larvas (por trofalaxis).**

**Composición:
Fipronil 0,05%**

Cebo en gel listo para su uso

Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas con el n.º ES/
MR(NA)-2021-18-00380

**USO EXCLUSIVO POR PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO.**

**UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA
SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACION SOBRE
EL BIOCIDA ANTES DE USARLO.**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y
EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES
DE USO.**

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Vida útil: 2 años

**Registrado por:
BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00**

® = Marca registrada de BASF

Contenido neto:

0,025 kg

**H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos duraderos.**

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

**P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente a través
de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de
acuerdo con la normativa vigente.**

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE
INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

Medidas básicas de actuación:

- Ingestión: enjuague la boca con agua. Póngase en contacto con un especialista en tratamiento de intoxicaciones. Acuda inmediatamente al médico si se presentan síntomas y/o se han ingerido grandes cantidades.
- En contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua, levantando de vez en cuando los párpados superiores e inferiores. Compruebe si hay lentes de contacto y quíteselas si es fácil hacerlo. Siga enjuagando con agua tibia durante al menos 10 minutos. Acudir al médico si se produce irritación o alteración de la visión.
- En contacto con la piel, quite la ropa y el calzado contaminados. Lave la piel contaminada con agua y jabón. Póngase en contacto con un especialista en tratamiento de intoxicaciones si se presentan síntomas.
- En caso de alteración de la consciencia, coloque en posición de recuperación y acuda inmediatamente al médico. No administre líquidos ni provoque el vómito.
- Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático y de soporte

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO
O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono (91) 562 04 20.
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**



Atención



81155559 ES 2091

Fourmidor®

Insecticida autorizado para el control de hormigas. Elimina adultos y larvas (por trofalaxis).

Composición:
Fipronil 0,05%

Cebo en gel listo para su uso

Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas con el n.º ES/MR(NA)-2021-18-00380

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDA ANTES DE USARLO.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Vida útil: 2 años

Registrado por:

BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

- Ingestión: enjuague la boca con agua. Póngase en contacto con un especialista en tratamiento de intoxicaciones. Acuda inmediatamente al médico si se presentan síntomas y/o se han ingerido grandes cantidades.
- En contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua, levantando de vez en cuando los párpados superiores e inferiores. Compruebe si hay lentes de contacto y quíteselas si es fácil hacerlo. Siga enjuagando con agua tibia durante al menos 10 minutos. Acudir al médico si se produce irritación o alteración de la visión.
- En contacto con la piel, quite la ropa y el calzado contaminados. Lave la piel contaminada con agua y jabón. Póngase en contacto con un especialista en tratamiento de intoxicaciones si se presentan síntomas.
- En caso de alteración de la consciencia, coloque en posición de recuperación y acuda inmediatamente al médico. No administre líquidos ni provoque el vómito.
- Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.


Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático y de soporte

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

® = Marca registrada de BASF

Atención



MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

No aplicar en áreas accesibles a los bebés o niños, ni a las mascotas u otros animales no diana (con el fin de minimizar el riesgo de envenenamiento). Aplicar estrictas medidas de higiene: No comer, beber ni fumar mientras se manipula el producto. No dañar el cartucho ni siquiera cuando esté vacío. No aplicar directamente sobre alimentos, bebidas y piensos ni cerca de ellos, ni sobre superficies o utensilios que probablemente estén en contacto directo con alimentos, bebidas, piensos y ganado. Aplicar únicamente en áreas que no vayan a quedar sumergidas o mojadas. Es decir, protegido de la lluvia, inundaciones o agua de lavado. En uso exterior, utilizar sólo en las cajas de cebo. Cuando esto no sea posible, se permite aplicar el gel en el interior de grietas y hendiduras con diámetro máximo de 5 mm. Este producto contiene fipronil que es peligroso para las abejas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fourmidor® permite destruir los hormigueros de las especies de hormigas comunes, siendo particularmente eficaz contra la hormiga negra (*Lasius niger*) y la hormiga argentina (*Linepithema humile*). Actúa por contacto e ingestión, a muy baja dosis. **Fourmidor**® puede usarse alrededor de viviendas y habitaciones (terrazas, muros, baldosas) e interior de habitaciones. Exterior e interior de locales y edificios. Gracias al modo de acción del cebo altamente atrayente, **Fourmidor**® es absorbido primero por las obreras y después, el principio activo es distribuido como alimento a la reina y a las larvas, que por regla general escapan a los tratamientos de pulverización tradicionales, en sus nidos ocultos.

CATEGORÍA USUARIO

Personal profesional especializado.

ORGANISMOS DIANA Y ÁMBITOS

Ámbito	Organismo diana
Interior y exterior (alrededor de edificios)	- Hormiga negra de jardín (<i>Lasius niger</i>) - Hormiga argentina (<i>Linepithema humile</i>) - Hormiga errática (<i>Tapinoma erraticum</i>) - Hormiga de pavimento (<i>Tetramorium caespitum</i>) - Hormiga invasora de jardín (<i>Lasius neglectus</i>) Elimina adultos y larvas (por trofalaxis)

MÉTODO DE APLICACIÓN

Cebo en gel líquido listo para usar.

Los cartuchos están diseñados para ser utilizados con la pistola aplicadora y con la punta suministrada para su aplicación. Si se va a reutilizar la punta aplicadora, se recomienda enjuagarla con agua caliente entre las aplicaciones. **Fourmidor**® es un cebo en gel líquido, de modo que las aplicaciones requieren sólo una ligera presión en el gatillo de la pistola aplicadora.

Uso en exterior:

El gel se debe colocar en las cajas de cebo para protegerlo de los organismos no diana y de la lluvia. Cuando esto no sea posible, se permite aplicar el gel en el interior de grietas y hendiduras (hasta un diámetro máximo de 5 mm) con el fin de minimizar el acceso a organismos no diana y agua de lluvia.

Uso en interior:

El gel se puede colocar directamente a través de la pistola aplicadora sin necesidad de utilizar la caja de cebo.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Hasta 3 gotas (con un peso de 0,03 g cada una y un diámetro de 3-4 mm) por metro a lo largo de los caminos de las hormigas dentro de las casas/edificios.

Hasta 3 gotas por caja de cebo y una caja por metro, para la aplicación de cajas de cebo en el exterior.

Las áreas tratadas deberán ser re-inspeccionadas después de 1-2 semanas. Puede requerirse una segunda aplicación si el primer tratamiento se ha consumido totalmente y aún quedan hormigas vivas después de una semana.

INSTRUCCIONES DE USO

Leer siempre la etiqueta o el folleto antes del uso y respetar todas las instrucciones indicadas.

Informar al titular de la autorización si el tratamiento no es eficaz.

No aplicar el producto en superficies absorbentes.

No exponer las gotas de cebo a la luz solar o a una fuente de calor (como por ejemplo, radiadores).

Para optimizar la eficacia del tratamiento, respetar las buenas prácticas de higiene: eliminar o evitar el acceso a cualquier fuente de alimento. El cebo debe de ser la principal fuente de alimento disponible para las hormigas.

Para optimizar la eficacia, comprobar los cebos una vez a la semana y reemplazarlos cuando estén total o parcialmente consumidos, dañados o sucios.

Al final de la campaña de tratamiento, recoger cualquier resto de producto para su eliminación.

Para evitar el desarrollo de poblaciones de insectos resistentes, se deben implementar las siguientes recomendaciones:

Alternar productos que contengan sustancias activas con diferente modo de acción.

Adoptar métodos de manejo integrado de plagas tales como la combinación de métodos de control químicos, físicos y otras medidas de salud pública, teniendo en cuenta las especificaciones locales (clima, especies diana, condiciones de uso etc.).

Comprobar la eficacia del producto en el sitio: si es necesario, se deben de investigar las causas de la reducción de la eficacia para asegurar que no haya resistencias o para identificar una resistencia potencial.

No utilizar el producto en áreas donde se sospeche que pueda haber resistencia o ésta ya esté establecida.

Evitar el uso continuado del producto.

En caso de que el tratamiento no resulte eficaz o se sospeche de resistencia, el titular de la autorización deberá informar a la Autoridad Competente.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO Y SU ENVASE

Al final de la campaña de tratamiento, recoger todas las cajas de cebo para su eliminación.

Nunca limpiar las cajas de cebo con agua entre tratamientos.

Durante la aplicación, eliminar el exceso de producto con un papel absorbente.

Eliminar el envase vacío, producto no usado, así como otros desechos como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

No verter el producto no utilizado en el suelo, en los cursos de agua, en las tuberías (lavabo, aseos...) ni en los desagües.

Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE.

ALMACENAMIENTO Y PERÍODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C.

Almacene alejado de la luz solar.

El producto es estable durante 2 años.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control. La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.