

Storm® Ultra

Control rápido y muy eficaz en cualquier situación.

STORM ULTRA - Flocumafén 0,0025 %

Biocida rodenticida anticoagulante.

Cebo en bloques listo para su uso.

- Interior: ratas y ratones

- Alrededor de edificios: ratas

Utilizar únicamente portacebos resistentes a la manipulación.

Registro:ES/MR(NA)-2019-14-00578

Antes de utilizar el producto, leer detenidamente la etiqueta.

Categoría usuario: público en general

Registrado por:

BASF Española S.L.

Sociedad Unipersonal

Can Rabia 3-5.

08017 BARCELONA.

Tel. 93 496 40 00.

© = Marca registrada de BASF



Contenido neto:

150g



81134728 ES1059

BASF

We create chemistry

Instrucciones de primeros auxilios: Este producto

contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 h. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina.

• **Antídoto:** vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.

• **En caso de:** • **Exposición dermal:** lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón. • **Exposición ocular:** compruebe siempre la

presencia de lentes de contacto y retirelas, enjuagar os ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.

• **Exposición oral:** enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere o

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA: TEL. 91 5620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta. • **Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.**

STORM ULTRA SECURE - Flocumafén 0,0025 %

Cebo en bloque listo para su uso.

Biocida rodenticida anticoagulante.

Este producto contiene un agente amargante y un colorante.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

Registro oficial biocidas: ES/MR(NA)-2019-14-00578.

Categoría usuario: público en general (no profesional)

Instrucciones de primeros auxilios

Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina.

Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.

En caso de:

- **Exposición dérmica**, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.

- **Exposición ocular**, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.

- **Exposición oral**, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. **Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20).** Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.

Protección del medio ambiente: Peligroso para la fauna salvaje.

Usos, dosis y frecuencia de aplicación: Ratón común (sólo interior) *Mus musculus*: 15 - 25 gr de cebo por portacebo (distancia mín. entre portacebos: 1 - 2 m). Rata parda o de alcantarilla y rata negra (uso interior y alrededor de edificaciones) *Rattus norvegicus* y *Rattus rattus*: 50 - 75 gr de cebo por portacebo (distancia mín. entre portacebos: 5 - 10 m).

Frecuencia: Recargar el portacebos cuando sea necesario. Revisar los portacebos al menos con la siguiente frecuencia para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos

y para retirar los roedores muertos:

Ratones (sólo interior): cada 2 - 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana.

Ratas: 5 - 7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana.

Instrucciones específicas de uso ALREDEDOR DE EDIFICACIONES: Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. • Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

Instrucciones de uso generales: Utilizar únicamente portacebos resistentes a la manipulación

• Usar guantes • Lea y siga la información del producto, así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo. • Antes de usar productos rodenticidas, se recomienda la utilización de métodos no químicos (p. ej. trampas).

• Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (p. ej. grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar. • Los portacebos deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras, etc.). • Cuando sea posible, el

portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. • Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto. • No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. • No colocar los portacebos cerca de sistemas de drenaje de agua donde el cebo pueda entrar en contacto con el agua. • Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. • Retirar el cebo sobrante y el portacebos al final del tratamiento. • Los portacebos deben estar claramente etiquetados indicando que contienen rodenticidas y que no deben ser movidos o abiertos, no mover o abrir, contiene un rodenticida: STORM ULTRA: Flocumafén; en caso de accidente, llame al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20). • Debido al modo de acción retardado, los rodenticidas anticoagulantes pueden tardar entre 4 y 10 días en ser efectivos tras el consumo del cebo. • Los roedores son transmisores de enfermedades. No

tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación.

Medidas de mitigación de riesgo: Aplicar medidas de control preventivas (p. ej. taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión. • No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores. • En caso de sospecha de falta de eficacia al final del tratamiento (p. ej. la actividad de los roedores sigue observándose) el usuario deberá contactar con el suministrador del producto o llamar a un servicio de control de plagas. • Buscar y retirar los roedores muertos durante el tratamiento, como mínimo siempre que se revisen los portacebos. • Eliminar los roedores muertos de acuerdo con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. • Mantener el envase cerrado y alejado de luz. • Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja. •

El producto es estable durante 2 años.

Eliminación del producto y su envase: Al final del tratamiento el cebo no consumido se gestionará de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. Los envases deberán depositarse en los contenedores de recogida separada según el material de los envases.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control. La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



® = Marca registrada de BASF